

ФИНОТЕРБ® КРЕМ



ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА НУСКАМА

Соодадагы аталышы

Финотерб

Эл аралык патенттелбеген аталышы

Тербинафин

Дарынын түрү

Сырттан колдонуу үчүн крем

Курамы:

Активдүү зат

Тербинафин гидрохлориди ВР 1% кжө/кжө

Көмөкчү заттар: суюк парафин, ак жумшак парафин, цетостеарил спирти, цетомакрогол 1000, натрий метилпарабен, натрий пропилпарабен, глицерил моностеараты, динатрий ЭДТА, глицерин, тазартылган суу.

Сүрөттөмөсү: Дээрлик ак жумшак масса.

Фармадарылык тобу: Тери ооруларын дарылоо үчүн препараттар. Тери ооруларын дарылоо үчүн мите козу карына каршы препараттар. Жерине колдонуу үчүн мите козу карына каршы препараттар. Жерине колдонуу үчүн мите козу карына каршы башка препараттар. Тербинафин.

АТХ коду: D01AE15.

Фармакологиялык таасири:

Фармакодинамикасы:

Мите козу карына каршы кенири активдүүлүккө ээ, жерине колдонуу үчүн мите козу карына каршы препарат. Тербинафин бир аз концентрацияларда дагы дерматофиттерге (*Trichophyton rubrum*, *T. mentagrophytes*, *T. verrucosum*, *T. violaceum*, *T. tonsurans*, *Microsporum canis*, *Epidermophyton floccosum*), көгөрөн (негизинен *C. albicans*) жана белгилүү диморфтуу мите козу карындарга карата фунгициддик таасир көрсөтөт. Дрожже мите козу карындарга карата активдүүлүгү алардын түрүнө жараша фунгициддик же фунгистатикалык болушу мүмкүн. Тербинафин мите козу карындарда жүрүп жаткан стеролдордун биосинтезинин эрте баскычын мүнөздүү түрдө өзгөртөт. Бул эргостеролдун жетишсиздигине жана скваленин клетка ичинде топтолуусуна алып келет, бул мите козу карындын клеткасынын өлүмүнө алып келет. Тербинафиндин таасири мите козу карындын клеткалык мембранасында жайгашкан скваленэпоксидаза ферментин басаңдатуу жолу менен ишке ашат. Тербинафин адамда P450 цитохрома системасына жана, ошого жараша гормондордун же башка дары препараттарынын зат алмашуусуна таасир көрсөтпөйт.

Фармакокинетикасы:

Жерине колдонууда сиңирүү — 5% дан азыраак, бир аз системалуу таасир көрсөтөт.

Колдонууга көрсөтмөлөр:

• Мите козу карындарды, теринин мите козу карын инфекцияларын, анын ичинде бүтүн кетменинин микоздору (бүтүн кетменинин «мите козу карындары»), чурай эпидермофитизис (*tinea cruris*), *Trichophyton* (а.и. *T. rubrum*, *T. mentagrophytes*, *T. verrucosum*, *T. violaceum*), *Microsporum canis* жана *Epidermophyton floccosum* пайда болгон дененин жылмакай терисинин мите козу карын жабыркоолорун алдын алуу жана дарылоо;

• Негизинен *Candida* түрүндөгүлөрдөн пайда болгон теринин дрожже мите козу карын инфекциялары (мисалы, *Candida albicans*), атап айтылган бышырауу;

• *Pityrosporum orbiculare* (ошондой эле *Malassezia furfur* аты менен белгилүү) пайда болгон түркүн түстүү чакалай (*Pityriasis versicolor*).

Колдонуу жолу жана дозалары:

Сырттан колдонуу үчүн.

Чоң адамдар жана 12 жаштан баштап балдар.

Финотерб креми күнүнө бир жолу же эки жолу сүйкөлөт.

Финотерб кремни сүйкөөнүн алдында жабыркаган жерлер суу менен тазаланат жана кургатылат. Теринин жабыркаган жерлерине кремди жука катмарда сүйкөп акырын сүртүү керек. Инфекциянын бышырауусу болгон учурда (субмаммардык, манжалар арасы, чурайлардын ортосу) түнкүсүн даки коюуга болот.

Дарылоонун орточо узактыгы: дененин, шыйрактын дерматомикозу - 1 жума күнүнө 1 жолу; бүтүн кетменин дерматомикозу - 1 жума күнүнө 1 жолу; теринин кандидозу - 1-2 жума күнүнө 1 же 2 жолу; түркүн түстүү чакалай: 2 жума күнүнө 1 же 2 жолу.

Клиникалык көрүнүштөрдүн айкындуулугунун азаюусу адатта дарылоонун биринчи күндөрү белгиленет. Үзүлтүктүү дарылоо же аны убактысынан эрте токтоткон учурда инфекциянын кайра кайталануу кооптуулугу бар. Эгерде бир эки жума дарылоодон кийин жакшыруу белгилери белгиленбесе, диагнозду верификациялоону жүргүзүү керек.

Улайык курчактары адамдарда препаратты дозалоо режими жогоруда сүрөттөлгөндөрдөн айырмаланбайт.

12 жашка чейинки балдарда бул препаратты колдонуу сунушталбайт.

Кыйыр таасирлери:

Иммундук система тарабынан: айрым билдирүүлөр — жогорку сезгичтик реакциялары (бөртмө).

Коруу органы тарабынан: сейрек — көздүн дүүлүгүүсү.

Терин катмары тарабынан: тез-тез — теринин түлөөсү, кычышуу; тез-тез эмес — теринин жабыркоосу, картгын пайда болуусу, тери жабыркоосу, пигментациянын бузулуусу, эритема, теринин ачышуусу сөзү; сейрек — теринин кургашын сөзү, контактуу дерматит, экзема; айрым билдирүүлөр — бөртмө.

Жериндеги реакциялар: тез-тез эмес - оору, сүйкөгөн жердин ооруусу, сүйкөлгөн жердин дүүлүгүүсү; сейрек — оорунун

симптомдорунун курчуусу. Препарат сүйкөлгөн жерлердин кычышуусу, теринин түлөөсү, оору сезими, дүүлүгүү, теринин пигментациясынын өзгөрүшү, ачышуу, эритема, карттар байкалышы мүмкүн. Бул маанилүү эмес симптомдорду бөртмө сыяктуу, сейрек учурларда пайда болуучу жана дарылоону токтотуунан талап кылган жогорку сезгичтик реакциясынан айырмалоо керек. Сейрек учурларда мите козу карын инфекциясынын өтүшү курчушу мүмкүн.

Эгерде көрсөтүлгөн кыйыр таасирлердин ичинен кайсы бири күчөсө, же бейтап ар кандай башка кыйыр таасирлери байкаса бул тууралуу дарыгерге билдирүүсү керек.

Каршы көрсөтмөлөр:

Тербинафинге же препараттын курамына кирген активдүү эмес ингредиенттердин ичинен кайсы бирине жогору сезгичтик; 12 жашка чейинки балдар курагы (жетинтүү клиникалык тажрыйбанын жоктугу); эне сүтүн эмизүү мезгили.

Этияттык менес: боор жана/же бөйрөк алсыздыгы, алкоголизм, чучук затынын кан жаратуусунун басаңдоосу, ишчимиктер, зат алмашуу оорулары, колу-буттардын кан тамырларынын окклюзиондук оорулары.

Ашыктама доза:

Сырттан колдонууда — ыктымалдуулугу аз.

Кокустан ичин алууда симптомдору: баш оору, окшуу, гастралгия, баш айлануу.

Дарылоо: активденкен көмүр, зарыл болсо оору белгилерин жоготууга багытталган колдоочу дарылоо.

Башка дары каражаттары менен өз ара таасири:

Аныкталган эмес.

Өзгөчө көрсөтмөлөр:

Финотерб креми сырттан колдонуу үчүн дайындалган. Көзгө түшүрүүдөн алыс болуу керек, себеби көздүн дүүлүгүүсүн пайда кылат. Кокустан көзгө түшкөн учурда аккан суу менен жууна.

Дүүлүгүүнүн туруктуу көрүнүштөрү өрчүгөн учурда дарыгер менен кенешүү зарыл. Аллергиялык реакциялар өрчүшүндө Финотерб препараттын токтотуу зарыл. Крем цетостеарил спиртин камтыт, ал жериндеги тери реакцияларын (мисалы, контактуу дерматит) пайда кылышы мүмкүн.

Көп бойлуктуу жана бала эмизүү

Эксперименталдык изилдөөлөрдө тербинафиндин тератогендик касиеттери аныкталган эмес. Азыркы убакка чейин тербинафинди колдонууда өрчүгүн кандайдыр бир кемтикти жөнүндө маалымдалган эмес. Бирок, кош бойлуу аялдарда тербинафинди колдонуунун клиникалык тажрыйбасы чектелүү болгондуктан, аны кош бойлуу мезгили колдонууга болбойт. Тербинафин эне сүтү менен бөлүнүп чыгат. Бирок, тербинафин кремдин бала эмизген эне колдонгон учурда тери аркылуу активдүү заттын бир аз өлчөмү сиңирилет, ошондуктан эне сүтүн эмизген убакта препаратты колдонууна.

Унаа каражатын башкаруу жана/же механизмдер менен иштөө жөндөмдүүлүгүнө таасири:

Унаа каражатын башкаруу же механизмдер менен иштөө жөндөмдүүлүгүнө таасир бербейт.

Чыгаруу формасы:

Басылган ийкемдүү алюминий түтүктө 20 г сырттан колдонуу үчүн крем.

Бир түб медицинада колдонуу боюнча нускамасы менен бирге картон танакта.

Сактоо шарты: Кургак, жарык тийбеген жерде 25°C дан жогору эмес аба табында сакталат.

Балдар жетеген жерде сактоо керек.

Тондурууга болбойт.

Жарактуулук мөөнөтү:

3 жыл. Жарактуулук мөөнөтү аяктагандан кийин колдонууга болбойт.

Берүү шарты:

Рецепти жок.



Vegapharm

Каттоо күбөлүгүнүн ээси:

Vegapharm LLP

Unit 18, 53 Norman Road, Greenwich Centre Business Park, London, England, SE109QF, UK (Улуу Британия)

Өндүрүүчү:

Lark Laboratories (India) Ltd.

SP-1192 E, Phase-IV, RIICO Industrial Area,

Bhiwadi, Dist. Alwar (Rajasthan), India (Индия)

Кыргыз Республикасынын аймагында керектөөчүлөрдөн продукциянын (товарнын) сапаты боюнча арыз-доолорду кабыл алуучу уюмдун дарег:

«Aman Pharma» (Аман Фарм) ЖЧК, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Шоорук көчөсү, 36.