

# ФИНОТЕРЬ® КРЕМ



## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

### Торговое название

Финотерб

### Международное непатентованное наименование

Тербинафин

### Лекарственная форма

Крем для наружного применения

### Состав:

#### Активное вещество

Тербинафина гидрохлорида ВР 1 % вес/вес

**Вспомогательные вещества:** жидкий парафин, белый мягкий парафин, цетостеариловый спирт, цетомacroгол 1000, метилпарабен натрия, пропилпарабен натрия, глицерил моностеарат, динатрия ЭДТА, глицерин, очищенная вода.

**Описание:** Почти белая мягкая масса.

**Фармакотерапевтическая группа:** Препараты для лечения заболеваний кожи. Противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи. Противогрибковые препараты для местного применения. Прочие противогрибковые препараты для местного применения. Тербинафин.

**Код АТХ:** D01AE15.

### Фармакологическое действие:

#### Фармакодинамика:

Противогрибковый препарат для местного применения, обладающий широким спектром противогрибковой активности. Даже в небольших концентрациях тербинафин оказывает фунгицидное действие в отношении дерматофитов (*Trichophyton rubrum*, *T. mentagrophytes*, *T. verrucosum*, *T. violaceum*, *T. tonsurans*, *Microsporum canis*, *Epidermophyton floccosum*), плесневых (в основном *C. albicans*) и определенных диморфных грибов (*Pityrosporum orbiculare*). Активность в отношении дрожжевых грибов, в зависимости от их вида, может быть фунгицидной или фунгистатической.

Тербинафин специфическим образом изменяет ранний этап биосинтеза стеролов, происходящего в грибах. Это ведет к дефициту эргостерола и внутриклеточному накоплению сквалена, что вызывает гибель клетки гриба. Действие тербинафина осуществляется путем ингибирования фермента скваленэпоксидазы, расположенного на клеточной мембране гриба. Тербинафин не оказывает влияния на систему цитохрома P450 у человека и, соответственно, на метаболизм гормонов или других лекарственных препаратов.

#### Фармакокинетика:

При местном применении абсорбция — менее 5%, оказывает незначительное системное действие.

### Показания к применению:

- Профилактика и лечение грибка, грибковых инфекций кожи, в том числе микозов стоп ("грибок" стопы), паховой эпидермофитии (*tinea cruris*), грибковых поражений гладкой кожи тела (*tinea corporis*), вызванных такими дерматофитами, как *Trichophyton* (в т.ч. *T. rubrum*, *T. mentagrophytes*, *T. verrucosum*, *T. violaceum*), *Microsporum canis* и *Epidermophyton floccosum*;
- Дрожжевые инфекции кожи, в основном те, которые вызываются родом *Candida* (например, *Candida albicans*), в частности опелодет;
- Разноцветный лишай (*Pityriasis versicolor*), вызываемый *Pityrosporum orbiculare* (также известный под названием *Malassezia furfur*).

### Способ применения и дозы:

Для наружного применения.

*Взрослые и дети с 12 лет.*

Финотерб крем наносят один раз или два раза в день.

Очистить и высушить пораженные участки водой перед нанесением крема Финотерб. Наносить крем на пораженные участки кожи тонким слоем и слегка втирать. В случае опелодети инфекции (субамарной, межпальцевые, межпальцевые) можно приложить ночью марлю.

*Средняя продолжительность лечения: дерматомикоз туловища, голеней - 1 неделя 1 раз в день; дерматомикоз стоп - 1 неделя 1 раз в день; кандидоз кожи - 1-2 недели 1 или 2 раза в день; разноцветный лишай: 2 недели 1 или 2 раза в день.*

Уменьшение выраженности клинических проявлений обычно отмечается в первые дни лечения. В случае нерегулярного лечения или преждевременного его прекращения существует риск возобновления инфекции. В случае, если через одну-две недели лечения не отмечается признаков улучшения, следует провести верификацию диагноза.

Режим дозирования препарата у лиц пожилого возраста не отличается от вышеописанного.

Не рекомендуется применение данного препарата у детей до 12 лет.

### Побочные действия:

*Со стороны иммунной системы:* отдельные сообщения — реакции гиперчувствительности (сыпь).

*Со стороны органа зрения:* редко — раздражение глаз.

*Со стороны кожных покровов:* часто — шелушение кожи, зуд; нечасто — повреждение кожи, образование корки, поражение кожи, нарушение пигментации, эритема, ощущение жжения кожи; редко — ощущение сухости кожи, контактный дерматит, экзема; отдельные сообщения — сыпь.

*Местные реакции:* нечасто - боль, боль в месте нанесения, раздражение в месте нанесения; редко — обострение симптомов заболевания. В местах нанесения препарата возможны наблюдаться зуд, шелушение кожи, болевые ощущения, раздражение, изменение

пигментации кожи, жжение, эритема, корки. Эти незначительные симптомы следует отличать от реакций гиперчувствительности, таких как сыпь, возникающих в редких случаях и требующих отмены терапии. В редких случаях течение грибковой инфекции может обостряться.

Если любые из указанных побочных эффектов усугубляются, или пациент заметил любые другие побочные эффекты, следует сообщить об этом врачу.

### Противопоказания:

Повышенная чувствительность к тербинафину или к любому из неактивных ингредиентов, входящих в состав препарата; детский возраст до 12 лет (отсутствие достаточного клинического опыта); период грудного вскармливания.

*С осторожностью:* печеночная и/или почечная недостаточность, алкоголизм, угнетение костномозгового кроветворения, опухоли, болезни обмена веществ, окклюзионные заболевания сосудов конечностей.

### Передозировка:

При наружном применении - маловероятна.

*Симптомы при случайном приеме внутрь:* головная боль, тошнота, гастралгия, головокружение.

*Лечение:* активированный уголь, при необходимости симптоматическая поддерживающая терапия.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не выявлено.

### Особые указания:

Финотерб крем предназначен для наружного использования. Следует избегать попадания в глаза, так как вызывает раздражение глаз. В случае случайного попадания в глаза, промойте глаза проточной водой.

В случае развития стойких явлений раздражения необходимо проконсультироваться с врачом. При развитии аллергических реакций необходимо отменить препарат Финотерб.

Крем содержит цетостеариловый спирт, который может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

### Беременность и лактация

В экспериментальных исследованиях тератогенных свойств тербинафина выявлено не было. До наступления времени не сообщалось о каких-либо пороках развития при применении тербинафина. Однако, поскольку клинический опыт применения тербинафина у беременных женщин очень ограничен, его не следует применять во время беременности.

Тербинафин выделяется с грудным молоком. Однако, в случае применения кормящей матерью тербинафина крема через кожу всасывается небольшое количество активного вещества, поэтому не следует применять препарат во время грудного вскармливания.

*Влияние на способность управлять автомобилем и/или работать с механизмами:*

Не влияет на способность управлять автомобилем или работу с механизмами.

### Форма выпуска:

Крем для наружного применения 20 г в напечатанной гибкой алюминиевой tube.

Одна tube вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной упаковке.

### Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не замораживать.

### Срок годности:

3 года. Не использовать после истечения срока годности.

### Условия отпуска:

Без рецепта.



Vegapharm

### Держатель регистрационного удостоверения:

Vegapharm LLP

Unit 18, 53 Norman Road, Greenwich Centre Business Park, London, England, SE10 9QE, UK (Великобритания)

### Производитель:

Lark Laboratories (India) Ltd.

SP-1192 E, Phase-IV, RIICO Industrial Area, Bhiwadi, Distt. Alwar (Rajasthan), India (Индия)

02K

Адрес организации, принимающей на территории Кыргызской Республики претензии от потребителей по качеству продукции (товара):

ОсОО «Аман Фарм» («Аман Фарми»), Республика Кыргызстан, город Бишкек, ул. Шооруква 36.

Тел: (0312)560466, E-mail: [aman\\_pharm12@gmail.com](mailto:aman_pharm12@gmail.com)