

Пардифен АКТИВ



ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА НУСКАМА

Соодадагы аталышы: Пардифен Актив.

Эл аралык патенттебеген же топтуу аталышы

Диклофенак + зыгыр майы + метилсалицилат + ментол

Дарынын түрү

Сырттан колдонуу үчүн гель

Курамы: ар бир грамм төмөнкүлөрдү камтыйт:

Активдүү заттар

Диклофенак диэтилами́н ВР

диклофенак натрийге тете 3% кт/и

Зыгыр майы 3% кт/и

Метилсалицилат ВР 10% кт/и

Ментол ВР 5% кт/и

Көмөкчү заттар: бензил спирти, карбомер 934, диэтилами́н, изопропил спирти, пропиленгликоль, полисорбат-80, цетостеари́л спирти, цетомacroгoл 1000, тазартылган суу.

Сүрөттөмөсү

Актан крем түскө чейинки жумшак масса.

Фармадарылык тобу:

Сөөк-бүлчүк системасынын ооруларын дарылоо үчүн препараттар.

Муун жана булчуң ооруларында жергиликтүү колдонуу үчүн

препараттар. Жергиликтүү колдонуу үчүн стероиддик эмес

сезгенүүгө каршы препараттар.

АТХ коду: M02AA.

Фармакологиялык касиети

Фармакодинамикасы

Пардифен Актив гель сезгенүүгө каршы таасир берет, б.а. сезгенүү процессинин ар кандай жерлерине таасир берет: антипростагландиндик таасир; жогору өткөргүчтүктүн төмөндөшү, микроциркуляция процесстеринин нормага келиши, гистамин, брадикинин ж.б. сезгенүү медиаторлорунун таасирин азайтышы. Ооруну басуучу касиети брадикинин таасирин азайтуу жөндөмдүүлүгүнө шартталган, ошондой эле жергиликтүү ысыкты төмөндөтүүчү таасирге түрткү берет.

Жергиликтүү колдонууда гель сыйпаган жердеги ооруну, анын ичинде тынч абалда же кыймылда муундардын оорунун азайтат же жоготот, эртең мененки эрки жоктукту жана муундардын шишимингн азайтат. Кыймыл коломун кобөйтүүгө түрткү берет.

Фармакокинетикасы

Жергиликтүү колдонууда жарым-жартылай тери аркылуу синет, биожектелүүгүндүгү - 6%. Плазма бөлүктөрү менен байланышы - 99,7%. Бойрок аркылуу бөлүнүп чыгат. Гель тез синет жана жанындагы ткандарга кирет: тери алдындагы клетчаткага, булчуң тканына, муун капсуласына жана муун коңдойно. Жергиликтүү дарылоо алган полиартритти бар оорулууларга (сезгенген муун таралка), муун суюктугундагы концентрациясы плазмадагы концентрацияга салыштырмалуу жогору.

Колдонууга көрсөтмө

• муундардын сезгенген жана дегенеративдик оорулары;

• жумшак ткандардын ревматизми;

• урунуп мертинүүлөр, байламталардын, булчуңдардын жана тарамыштардын чоюлушу;

• жумшак ткандардын сезгенген шишимиктери, денеге оор күч келүүдөн пайда болгон булчуңдардын жана муундардын оорукенушү.

Каршы көрсөтмө

• диклофенакка жана препараттын башка курамындагыларга жогорку сезгичтик;

• ацетилсалицил кислотасына же башка ССККа жогору сезгичтик (анын ичинде "аспириндик триада");

• курчуу фазасындагы ашказан жана 12 эли ичегинин жара оорусу;

• кош бойлуулуктун III үч айлыгы;

• 14 жашка чейинки балдар.

Этияттык менен: Пардифен Актив Гель препаратынын теринин жабыркаган жерлеринин үстүнө, ачык жарааттарга, көзгө жана былжырлуу чел кабыкка түшүүсүнөн алыс болуу керек.

Пардифен Актив Гелди колдонбош керек.

Колдонуу жолу жана дозасы

Сырттан гана колдонуу үчүн!

Чоң адамдарга жана 14 жаштан жогору балдарга: 2-4 г гель (түткүчтүн оозу толук ачык болушунда 4-8 см гелдин тилкеми) сезгенүү оочунун үстүндөгү териге жука катмарда сыйпалат жана суткасына 2-3 жолу акырын сүртүлөт. Препараты сыйпагандан кийин колду жууп салуу зарыл. Гелдин эң жогорку суткалык дозасы 8 г дан жогору болбошу керек. Дарылоо курсунун узактыгы дарыгер менен кеңештестен 14 күндөн жогору болбошу керек.

Препаратты дарыгердин дайындоосу боюнча эмес колдонгон учурларда, эгерде дарылоодон 7 күндөн кийин бейтаптын абалы жакшырбаса же начарласа дарыгерге кеңешүү үчүн кайрылуу керек. Улгайган курактагы бейтаптарга препараттын дозасын түзөтүү талап кылынбайт.

Кыйыр таасирлери

Пайда болгон кыйыр таасирлери жекече сезгичтикке, колдонулган дозанын чоңдугуна жана дарылоонун узактыгына көз каранды.

Жергиликтүү реакциялар: экзема, жарыкка сезгичтик, контактуу дерматит (кычышуу, кызаруу, теринин тазаланган жеринин шишимиги, жумшак бөртмөлөр, исиректер, түлөө).

Системалуу реакциялар: жайылган тери бөртмөсү, аллергиялык реакциялар (бөрү жатыш, ангионевротикалык шишимик, бронхоспастикалык реакциялар).

Ашыкча доза

Симптомдору: гелди сыйпоодо системалуу сиңиши төмөн болгондуктан дозасынан ашыруу мүмкүн эмес. Капыстан жутуп алууда системалуу кыйыр реакциялары өрчүшү мүмкүн.

Дарылоо: ашказанды суу менен тазалоо, кустируу, активдешкен көмүр, заараны тездетип ыччам айдап чыгуу, белгилерине жараша дарылоо. Диклофенактын бөлүктөрү менен байланышуу деңгээли жогору болгондуктан диализ натыйжалуу эмес.

Башка дары каражаттары менен өз ара таасири

Гелди колдондорун алдында эгерде сиз дарыгердин көзөмөлү алдында болонсуз же башка ССККды колдонуп жатсаңыз дарыгер менен кеңешүү керек.

Препарат фотосенсибилизацияны пайда кылуучу препараттардын таасирин күчөтүшү мүмкүн. Башка дары каражаттары менен клиникалык олуттуу өз ара таасирлери сүрөттөлгөн эмес.

Өзгөчө көрсөтмөлөр

Гелдин ачык жаратка түшүүсүнөн алыс болуп, жабыркабаган териге гана сыйпоо керек. Сыйпагандан кийин жабык таныгы койбош керек. Препаратты көзгө жана былжырлуу чел кабыкка түшүрбөш керек. Препаратты көп өлчөмдө узакка колдонууда ССККлар үчүн мүнөздүү системалуу кыйыр таасирлеринин пайда болушун жокко чыгарууга болбойт.

Кандайдыр-бир тери исиректөөлөрү пайда болушунда дарылоону токтотуу керек.

Көп бойлуулук жана бала эмизүү мезгили

Көп бойлуулуктун III үч айлыгында препаратты колдонуу каршы көрсөтүлгөн. I жана II үч айлыгында дарыгер менен кеңешкенден кийин гана колдонулушу мүмкүн.

Бала эмизүү мезгилинде дарыгердин пикири боюнча эне үчүн күтүлгөн пайдасы бала үчүн келтирилген коркунучтан жогору учурларда негиз болушунда колдонулушу мүмкүн. Препаратты сүт безлерине же теринин чоң бөлүктөрүнө сыйпоого болбойт жана узак убакыт бою колдонууга болбойт.

Автоунааны башкарууда же башка механизмдер менен иштөөдө ылайык реакциясына таасир тийгизүү жөндөмдүүлүгү.

Таасир тийгизбейт.

Чыгаруу формасы

Алюминий тубада 30 г сырттан колдонуу үчүн гель.

Бир туб медицинада колдонуу боюнча нускамасы менен бирге картон кутуда.

Сактоо шарты

Кургак, жарыктан корголгон, 25°C дан жогору эмес аба табында сакталат.

Балдар жетпеген жерде сактоо керек.

Тондурбаш керек!

Жарактуулук мөөнөтү

30 ай. Жарактуулук мөөнөтү бүткөндөн кийин колдонууга болбойт.

Берүү шарты

Ресепти жок.

Соода маркасынын жана каттоо күбөлүгүнүн ээси

Vegapharm LLP

Unit 18, 53 Norman Road, Greenwich Centre Business Park,

London, England, SE109QF, UK (Улуу Британия)

Өндүрүүчү

Lark Laboratories (India) Ltd.

SP-1192 E, Phase-IV, RICO Industrial Area,

Bhiwadi, Distt. Alwar (Rajasthan), India (Индия)



Vegapharm

Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүмдүн (товардын) сапаты боюнча керектөөчүлөрдүн арыз-доолорду кабыл алуучу уюмдун дарегин

«Аман Фарм» (Аман Фарм) ЖЧК, Кыргызстан Республикасы, Бишкек шаары, Шооруюк көч. 36.

Тел.: (0312) 560466, E-mail: aman.pharm12@gmail.com